

Превентивные меры против диареи

Эксперименты и практический опыт показали, что некоторые превентивные действия могут предотвратить диарею.

Оксид цинка

- Предписанный ветеринаром оксид цинка можно скармливать в течение от 0 до 14 дней после отъема
- Необходимо скармливать 3 кг оксида цинка на тонну корма

Недавно отлученные поросята должны начинать пожирать корм как можно быстрее

- В станке для опороса должна быть та же смесь, что и при отъеме
- Свободный доступ к свежей воде, например, к поилке, поливному устройству или к системе мелкодисперсного распыления воды
- Частое кормление в первые сутки (мин. 4 раза в день) в кормушке/с пола (можно комбинировать с подачей свежей воды)
- При кормлении поросят с пола корм должен пожираться в течение прибл. ½ часа с момента подачи
- Привлекательные корма с большим количеством приятного на вкус и легко усвояемого сырья, напр., сухого молока, сухой сыворотки, рыбной муки, кровяной плазмы и т.п.
- В станке с отлученными поросятами должно быть светло в течение как минимум 8 часов в день

Ограниченное кормление

- Место для одновременного пожирания корма всеми поросятами
- Кормление мин. 4 раза в день – корм пожирается за 15 мин.
- Огр. кормление приводит к пониженному ежедневному привесу
- Практикуется только в период появления проблем с диареей, часто через 4-10 дней после отъема
- См. также: "Требования к подаче воды и кормов"

Мучные корма или экспандат в сравнении с гранулир. кормами

- Благоприятно влияют на пищеварение и противодействуют диарее
- Однако возникает повыш. риск образования заторов и потери кормов
- Необходим дополнительный мониторинг кормоавтоматов

Органические кислоты

- Добавление по крайней мере 1% кислоты (0,5 % бензойной кислоты) повышает продуктивность
- Подтвержденный эффект противодействия диарее при добавлении более, чем 2% кислоты.
- Добавление кислоты часто способствует усвояемости поросятами большего кол-ва протеина в корме, что повышает продуктивность

Другие меры:

- Вакцинация против Lawsonia
- Вакцинация против PCV 2
- Картофельная мука
- А-38
- Пробиотики
- Термообработан. торф



Ограниченное кормление недавно отлученных поросят в длинной кормушке



Мучные корма и экспандат оказывают положительный эффект при диарее