

Диагностика диареи

Причину возникновения диареи у поросят и откормочных свиней необходимо исследовать, чтобы выявить, против чего должно быть направлено лечение.

Признаки заболевания

- Договоритесь с ветеринаром о признаках диареи, на которые следует обращать внимание
- Договоритесь с ветеринаром о том, когда делать инъекции и проводить лечение всех свиней в станке
- Ведите ежедневные записи о признаках заболевания

Вскрытие трупов свиней в стаде

- Может прояснить картину болезни и способствовать быстрому вмешательству
- Материал может быть отправлен в лабораторию для дополнительного исследования

Расширенный ветеринарный осмотр свиней (РВО)

- Большое количество мертвых свиней отправляется на вскрытие в лабораторию по изучению свиных болезней на основе договора и по итоговой цене

Культивирование бактерий в лаборатории

- Определение восприимчивости свиней в стаде к E.coli
- Исследования дизентерии и гемолизирующих спирохетов

Комплекс кишечных исследований на ПЦР

- Исследование, показывающее наличие или отсутствие патогенных микроорганизмов в животном навозе. Lawsonia, E.coli, PCV2 и B. pilisocoli исследуются одновременно
- Образцы должны происходить от водянистой диареи
- Цена: 3.795 дат. крон за 4 пробы (сентябрь 2012)

Анализ крови

- Антитела к Lawsonia
- Обнаружение вируса PCV2

РВО поросят в Лаборатории в г. Кьеллеруп

- Вскрытие 10 поросят по договору
- Цена: 1.960 дат. крон (декабрь 2012)

При вспышке заболевания, сопровождающейся повышенным падежом, обратитесь к ветеринару



Свинья с навозом на задней части



Водянистый навоз на щелевом полу



Вскрытие в стаде



Вскрытие в лаборатории