

# Использование антибиотиков в жидких кормах

В стаде с системой раздачи жидких кормов групповое лечение проводится напрямую в желобковой кормушке. **Запрещается** смешивать антибиотики в установке для раздачи жидких кормов.

## Возможности группового лечения при использовании жидких кормов

Для раздачи раствора антибиотика в станках можно использовать:

- Ведро
- Medliq® (добавляется через ниспадающую трубу)
- Прицеп-цистерну (контейнер) с резервуаром и насосом или т.п.

## Последовательность операций

1. При расчете необходимого количества антибиотика учитывайте количество свиней на кормушку и их вес
2. Определите количество литров воды, необходимых для распределения раствора по всей кормушке
3. Приготовьте раствор антибиотика путем смешивания расчетного количества антибиотика с водой
4. Используйте чистое ведро или прицеп-цистерну (контейнер)
5. Влейте приготовленный раствор антибиотика в кормушку **непосредственно перед кормлением**

## Добавление с помощью Medliq® по трубам для раздачи жидких кормов – методика операций

1. Приготовьте раствор антибиотика, соответствующий тому количеству животных (и их весу), которое понадобится лечить
2. Проследите, чтобы на следующий день контейнер был пуст
3. Очистите контейнер по окончании лечения

## Персональная безопасность

При контакте или вдыхании антибиотиков существует риск аллергии. При работе с антибиотиками надевайте перчатки и маску при работе.

### Соблюдение норм для получения помощи от ЕС при лечении антибиотиками в кормах:

- **Запрещается** смешивать антибиотики в смесителе для жидких кормов
- **Запрещается** транспортировать корма с антибиотиками в систему подачи корма
- Не забывайте соблюдать предубойный период откорма после лечения антибиотиками



Определите объем антибиотика для лечения в мл

Влейте раствор



антибиотика в кормушку непосредственно перед кормлением



Антибиотик можно добавлять в ниспадающую трубу с помощью Medliq®