

Грижа:

десять порад для зниження ризику

1

Станок для опоросу повинен бути продезінфікований і висушений.

3

Зробіть все можливе, щоб полегшити опорос.

5


Укорочуйте пуповину максимум на три сантиметри. В галузі немає єдиної думки про те, яку пуповину краще підрізати - мокру або суху. Найкраще вкорочувати пуповину перепалюванням, при цьому не поспішайте і не відривайте пуповину. При використанні ножиць їх необхідно дезінфікувати після кожного поросятя.

7

Після укорочення пуповини накладіть на неї пластир.

9

Не здавлюйте живіт поросля під час кастрації.



2

По всьому станку повинна бути викладена солома в якості м'якої підстилки.

4

Забезпечити помірну кількість деревної тирси або картопляного борошна, можливо, в суміші з сталосаном Ф (Stalosan F®) або іншим дезінфікуючим засобом, в будиночку для порослят.

6

Продезінфікуйте пупок спиртовим хлоргексидином або спиртовим йодом. Можна також використовувати Цикло Спрей або інший спрей з антибіотиком, але не забудьте зареєструвати його як антибіотик.

8

Піднімайте і опускайте поросля в станок, тримаючи його під животом, і не затискайте його.

10

Забезпечте всім порослям достатню кількість молозива і уникайте появи у них діареї та кашлю.



svineproduktion.dk